

HUR MAN TVÄTTAR HELA KROPPEN FÖR SÄNGBUNDNA PATIENTER MED ANTIMIKROBIELL HIBIWASH®

BINDER TILL OCH VÅRDAR HUDEN SAMTIDIGT SOM DEN DÖDAR BAKTERIER.




STEG 1: Tvätta av ansiktet med nedåtgående rörelser. Undvik kontakt med ögon, näsborrar, öron och mun.




STEG 2: Tvätta av hals och bröst med nedåtgående rörelser.



STEG 3: Tvätta av patientens vänstra arm, armhåla och hand med nedåtgående rörelser. Upprepa samma procedur för patientens högra arm, armhåla och hand.




STEG 4: Tvätta av magen, lumsken och skrevet med nedåtgående rörelser och var noggrann runt naveln.



STEG 5: Vänd patienten på sidan och tvätta av ryggen med nedåtgående rörelser.



STEG 6: Rör dig mot rumpan och rengör området med nedåtgående rörelser.



STEG 7: Placera patienten i utgångsläget och tvätta sedan av höger ben och fot med nedåtgående rörelser. Upprepa samma åtgärd för patientens vänstra ben och fot.



STEG 8: Upprepa STEG 1-7 använd rena tvättlappar, fuktade enbart med vatten, för att skölja av.



Hibiwash®
binder till huden



Tvätta håret med Hibiwash® och skölj noga. Följ sjukhusets riktlinjer för sängliggande patienter.

FÖR KROPPEN

- Använd ett desinficerat tvättkärl och häll rent, varmt vatten i det. Placera det nära patientens säng. Använd en ren tvättlapp för varje steg. Fukta trasorna med vatten från tvättkärl och tillsätt en liten mängd Hibiwash®.
- Upprepa STEG 1-7 med våta tvättlappar ENDAST för att skölja av.
- Doppa ALDRIG en använd tvättlapp i tvättkärl.
- Kassera kvarvarande vatten och använd tvättlappar på ett säkert sätt på avsedda platser och i enlighet med sjukhusets riktlinjer.
- Desinficera tvättkärl innan det används för nästa patient.

Hjälp oss att minska den **11-procentiga risken** för postoperativa sårinfektioner.¹

Hibiwash® är din **pålitliga partner** när det gäller att förebygga infektioner, främja hudens integritet och spara tid innan kirurgiska ingrepp.

Tillsammans mot en nollvision.

LÄS MER PÅ WWW.MOLNLYCKE.SE

Hibiwash® (klorhexidindiglukonat) 40mg/ml kutan lösning. OTC.RX. EF. ATC-kod: D08AC52. Indikation: preoperativ och postoperativ desinfektion av händerna och huden hos vuxna och barn. Använd ej vid allergi mot klorhexidin/innehållsämne. Använd ej på hjärnan, meningen, i mellanörat, i ögon, slemhinnor eller på djupa/stora sår. Risk för allvarliga hornhinneskador vid ögonkontakt. Vid huvud- eller ryggmärgsskada eller perforerad trumhinna, väg nytta mot risk för hjärn-/hinnekontakt. Får ej injiceras eller användas i kroppshålor. Risk för kemiska brännskador hos nyfödda, särskilt prematurer. Risk för överkänslighet, inkl. anafylaxi. Lättantändligt. För mer information se produktresumén (senast uppd.:2025-02) på www.fass.se

Med 4% klorhexidindiglukonat

1. Gillespie B.M. 2021. Worldwide incidence of surgical site infections in general surgical patients: A systematic review and meta-analysis of 488,594 patients. International Journal of Surgery, 95, s. 106136.

Mölnlycke Health Care AB, Box 6, Entreprenörstråket 21, SE-431 21 Mölndal Sverige. Tel+ 46 31 722 30 00. Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke, Hibiwash, Hibi är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group ©2025 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. Ersätt med: HQIM007720SE

